

CLENPIQ™
 (sodium picosulfate, magnesium oxide,
 and anhydrous citric acid) Oral Solution
 10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

**CLENPIQ 복용
 단계별 준비 과정
 분할 복용 방법**

전날 저녁
 오후 5-9시 사이



40 온스(5컵)의 맑은 음료를 마십니다.*
 다음 5시간에 걸쳐 음료를 모두 마십니다.

당일 아침
 절차 5시간 전



최소 24 온스(3컵)의 맑은 음료를 마십니다.
 대장내시경 2시간 전 또는 의사가 지시한 시간까지 음료를 모두 마십니다.



수분 섭취는 중요하며 준비 과정의 일부입니다. 대장내시경 준비 전, 준비 중 및 준비 후에 수분을 충분히 섭취하십시오.

준비 과정 보조 도구 준비 과정 보조 도구를 준비 과정 완료 가이드로 사용하십시오.

귀하의 대장내시경 일시는 다음과 같습니다. _____ : _____

준비 및 수분 공급은 다음 시간까지 완료합니다. _____ : _____

대장내시경 전날에는,
 모든 고형식 및 유제품
 섭취를 중단하고 맑은
 음료로 수분 공급을
 시작하십시오.



대장내시경 전날 저녁

CLENPIQ 1병 마시기
 CLENPIQ을 약병에 든 상태로 마십니다.

이후 계속 수분을 섭취합니다
 5컵(각 8 온스)의 맑은 음료를 마십니다.
 음료를 마실 때마다 아래의 컵에 체크하십시오!



시작: _____ : _____
 완료: _____ : _____

대장내시경 당일 아침

CLENPIQ 나머지 1병 마시기
 CLENPIQ을 약병에 든 상태로 마십니다.

이후 계속 수분을 섭취합니다
 최소 3컵(각 8 온스)의 맑은 음료를 마십니다.
 음료를 마실 때마다 아래의 컵에 체크하십시오!



시작: _____ : _____
 완료: _____ : _____

*조퇴 복용 후에 심한 평만, 부종 또는 복통이 발생하는 경우, 증상이 해소될 때까지 두 번째 복용을 연기하십시오.
 CLENPIQ, 맑은 유동식 및 수분 공급의 중요성에 대한 상세한 정보는 뒷면을 참조하십시오.

적응증

CLENPIQ은 대장내시경 이전에 대장을 비워 주는 성인용 처방약입니다. CLENPIQ은 설사를 유도하여 대장을 비워 줍니다. 대장을 비움으로써 대장내시경 시 의료 서비스 제공자가 귀하의 대장 내부를 더 명확하게 관찰할 수 있습니다.

중요 안전성 정보

- 의료 서비스 제공자가 귀하에게 중대한 신장 문제, 장 폐색(장 폐쇄), 위 또는 장 복벽의 구멍 뚫림(장 천공), 매우 확장된 장(독성 거대결장), 위장의 음식 및 액체 배출 문제(위 정체) 또는 CLENPIQ의 어느 성분에도 알러지가 있다고 말한 경우, CLENPIQ을 복용하지 마십시오.
- CLENPIQ 및 기타 장 정결은 중대한 체액 상실(탈수) 및 혈중 염분(전해질) 변화를 비롯한 중대한 부작용을 초래할 수 있습니다. 이러한 변화는 심박 이상을 초래하며, 이는 사망, 발작(이전에 발작을 경험하지 않은 경우에도 발생할 수 있음) 또는 신장 문제로 이어질 수 있습니다. 심장 문제, 신장 문제가 있거나 이뇨제 또는 비스테로이드성 소염제(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)를 복용하는 경우 CLENPIQ로 인한 체액 상실 및 혈중 염분 변화 가능성이 보다 높습니다.

상세한 중요 안전성 정보는 뒷면을 참조하십시오.

준비 과정의 시작부터 완료까지



CLENPIQ[™]
(sodium picosulfate, magnesium oxide, and anhydrous citric acid) Oral Solution
10 mg/5.5 g/12 g per 160 mL bottle

CLENPIQ이란 무엇인가요?

CLENPIQ은 대장을 비워 주는 처방약입니다.
CLENPIQ은 약병에 든 상태로 바로 마실 수 있습니다. 혼합하거나 희석할 필요가 없습니다.
CLENPIQ을 냉장 또는 냉동 보관하지 마십시오.

CLENPIQ 상자는 어떻게 구성되어 있습니까?

CLENPIQ 2병 (각 5.4 온스)
많은 음료 섭취용 8 온스 컵 1개
참고용 환자 복약지도 및 사용 지침

CLENPIQ 약병 액기

약병을 평평한 바닥에 놓습니다. 뚜껑을 왼쪽(반시계 방향)으로 돌리면서 뚜껑을 누릅니다.
뚜껑 아래 부분의 흰색 플라스틱 고리가 끊어질 때까지 뚜껑을 돌립니다.



수분 섭취 시작하기

수분 섭취용으로 허용되는 많은 음료

물	진저에어 및 기타 탄산음료
블랙 커피 또는 차	사과 주스 또는 백포도 주스의 많은 주스
많은 수프 또는 장국	무향 젤리
스포츠 음료	하드 아이스크림

대장내시경 전부터는 많은 음료만 섭취하여
수분 공급을 시작하고 모든 고통 및 유제품
섭취를 중단하십시오.

대장내시경 준비 전, 준비 중 및 준비 후에
수분을 충분히 공급하는 것이 중요합니다.
의사의 지침을 철저히 따르십시오.

이 음료는 붉은색이나 보라색이어서는 안 됩니다. 음료, 과일, 우유, 크림, 우유 또는 비우제품(커피, 기타 콜로이드)은
섭취하지 마십시오.

준비 되셨습니까? 이 동영상 이 도움이 될 수 있습니다. www.clenpiq.com에서 동영상에 따라 수분 섭취하십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

- 귀하가 CLENPIQ를 복용한 후, 귀하의 의료 서비스가 제공자가 혈중 변화를 확인하기 위해 혈액 검사를 실시할 수 있습니다. 지나친 체액 축적(탈수)로 인한 원치 않는 증상(구토, 메스꺼움, 팽만감, 어지러움, 복부 경련, 팽소 또는 적은 소변 횟수, 많은 응고물, 마시지 어려움, 삼키기 어려움, 탈락 또는 신장 문제)을 경험하는 경우, 즉시 의료 서비스에 연락하여 알려주세요.
- CLENPIQ은 정맥 주사 또는 정맥(하혈관정맥)을 사용할 수 있습니다. 신장 부종 또는 좌상 허혈이 있는 경우 즉시 의료 서비스에 연락하여 알려주세요.
- CLENPIQ은 정맥 주사 또는 정맥(하혈관정맥)을 사용할 수 있습니다. 신장 부종 또는 좌상 허혈이 있는 경우 즉시 의료 서비스에 연락하여 알려주세요.

제품의 부작용을 보고하려면 FDA에 보고하십시오. www.fda.gov/medwatch 사이트를 방문하십시오. 1-800-FDA-1088번으로 전화하십시오.

응용되어 있는 복약지도를 포함한 전체 처방 정보를 참조하거나 www.clenpiq.com 사이트를 방문하십시오.