

Ivan Friedrich, MD • Kenneth P. Rubin, MD • Mark S. Sapienza, MD • Irina Kaplounov,
MD • Sandarsh R. Kancherla, MD • Grace H. Yang, MD

Diplomates, American Board of Gastroenterology and Internal Medicine

ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)

NOMBRE: _____ MEDICO: _____

DIA Y FECHA: _____ HORA DE EXAMEN: _____ HORA DE LLEGAR: _____

LUGAR: _____ PRESENTESE: _____

Tenga en cuenta: La poliza de cancelacion es de 24 horas. Se cobrara una multa de \$125 por cada procedimiento que se cancelado con menos de 24 horas de anticipacion.

Descripcion

ERCP es una clase de endoscopia hecha en un hospital. Generalmente se hace para diagnosticar y tratar a pacientes que sufren de condiciones de el higado, conducto biliar, pancreas, o vesicula. Este procedimiento se hace bajo anestesia con el paciente acostado sobre su estomago. Cuando el paciente ya esta dormido, un instrument endoscopico es introducido por la boca hasta llegar al estomago y principios de el intestino delgado. La entrada de el conducto biliar o conducto pancreatico puede ser visualizada y es accesable con un alambre y un pequeno tuboplastico. Despues, un medio de contraste es inyectado en los conductos y imagenes son obtenidas con una maquina de Rayos-X. Una pequena incision usualmente es hecha, llamada esfinterotomia, para permitir mayor acceso y drenaje. Si es applicable a usted, los calculos pueden ser removidos y biopsias o cepillado para citologia pueden ser obtenidas. Un malla tambien puede ser colocado para aliviar una obstruccion de flujo biliar. El procedimiento puede durar de 30 minutos a mas de una hora.

Preparacion ANTES de su ERCP

- Por favor no coma ni beba el dia de su procedimiento. Si su cita esta programada para la tarde, puede tomar liquidos hasta 4 horas antes de su examen.
- Por favor informe a su medico si tiene cualquier alergia - particularmente a medio de contraste como el yodo.
- El procedimiento se hace en un entorno ambulatorio pero aveces es necesario pasar la noche en el hospital. Es una buena idea llevarse una pequena maleta empacada por si acaso tiene que quedarse en el hospital.
- Por favor pidale a un amigo o familiar que lo lleve de regreso a su casa. Usted no podra conducir por 24 horas despues de su procedimiento.
- Si usted toma cualquier anticoagulant como aspirina, Coumadin, Pradaxa, Xarelto, Plavix, o Eliquis, tendra que suspenderlos antes de su cita. Favor de hablar en detalle con su medico para hacer arreglos previos.
- Este procedimiento se hace con Rayos-X. Si usted esta embarazada o sospecha que pudiera estar embarazada favor de informarse a su medico de inmediato. Toda mujer de edad fertile sera sometida a una prueba de embarazo antes de su procedimiento.

Despues de su ERCP

Por favor informenos si tiene dolor severo o malestar despues de su procedimiento.