

Ivan Friedrich, MD • Kenneth P. Rubin, MD • Mark S. Sapienza, MD • Irina Kaplounov,
MD • Sandarsh R. Kancherla, MD • Grace H. Yang, MD

Diplomates, American Board of Gastroenterology and Internal Medicine

Modified Colonoscopy Prep

NOMBRE: _____ MEDICO: _____

DIA Y FECHA: _____ HORA DE EXAMEN: _____ HORA DE LLEGAR: _____

LUGAR: _____ PRESENTESE: _____

Tenga en cuenta: La poliza de cancelacion es de 24 horas. Se cobrara una multa de \$125 por cada procedimiento que se cancelado con menos de 24 horas de anticipacion.

**UNA Semana
ANTES de su
procedimiento**

- Averigüe con nuestra oficina para obtener instrucciones específicas si usted toma cualquier anticoagulante (Coumadin, Pradaxa, Effient, Aspirina (Ecotrin), Eliquis, Xarelto, Plavix, etc.)
- Averigüe con su médico para obtener instrucciones específicas si usted toma alguna medicina para la diabetes (Insulina, Metformin, Janumet, Glipizide, etc.)
- Obtenga su receta de Trilyte en la farmacia. También tendrá que comprar una botella de 10 onzas de Citrato de Magnesio (no sabor de cerezas) que se puede comprar sin receta.
- Discontinúe hierro oral 5 días antes de su cita. (multivitaminas con hierro son permitidas)

**El día ANTES de su
procedimiento**

- Al despertarse, COMIENZE una DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- NO puede consumir LIQUIDOS ROJOS (No leche ni jugo de naranja)
- Gatorade, jugos claros, agua, paletas de hielo, té y café negro están permitidos
- A las 4-6 PM BEBASE la botella entera de Citrato de Magnesio
- A las 6-8 PM COMIENZE a tomar 4 LITROS de Trilyte durante unas cuantas horas. Si empieza a sentir náusea, tómese un receso de una hora y luego vuelva a beber la solución de Trilyte hasta acabarsela. Puede dejar de tomar

**El día de su
procedimiento**

el Trilyte antes si esta evacuando heces liquidas, claras, y amarillas en color.

Para hacer la preparacion mas facil de tolerar, use paletas de dulce (ROJASestan PERMITIDAS) y tambien ENFRIE la solucion de Trilyte en el refrigerador

- Continúe su DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- Descanse
- Al Despertarse, tomese todas sus medicinas regulares con un poco de agua.
- Continúe su DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- 4 Horas antes de su cita: PARE de tomar liquidos – NADA!NO chicle ni dulces
NO colonias, perfumes, ni lociones por favor
- Necesitara transporte para regresar a su casaNO podra guiar hasta el dia siguiente .
- Toda mujer de edad fertile sera sometida a una prueba de embarazo cuandola llegue al centro.