

Barry M. Zingler, MD • Mitchell K. Spinnell, MD • Michael E. Meininger, MD • Marc A. Fiorillo, MD  
Eugene S. Han, MD • Kyoung S. Baek, APN • Tatiana Valderrama, MSN, APN-BC

## 대장내시경(Colonoscopy) 준비사항SUPREP- AM

성명(Name):

담당의: Dr.

예약날짜(Date):

도착시간 (Time to Register):

장소(Location):

도착보고:

**유의사항:** 1. 시술취소의경우48 시간전에알려주십시오. 시술48 시간이내에취소할경우\$125 의비용이부과됩니다.

2. 뉴저지법에따라시술후마취의영향으로인해 반드시운전해주시분이있어야합니다

### 시술 하루 전날

- 아침부터 밤 12 시나 새벽 1 시까지 물이나 맑은 음료들을(가능한 많이) 계속 드십시오. (예: 물, 사과주스, 게토레이드, 레모네이드, 하얀색 의 포도주스나 크랜베리 주스, 블랙커피, 차, 소다종류, 비타민 워터, Jell-O, 얼음 디저트 등)
- 금지제품:** 우유나 우유 성분이 들어간 것, 오렌지 주스, 빨간색과 진한색깔의 주스

### 약 복용법 - 시술 하루 전

- 2 개의 6 온스 약병중 한개를 믹싱용기에 붓고 물이나 맑은 음료를 용기의 16oz 선까지 부어 잘 섞어준 후 복용 준비를 합니다.
  - 7 PM :** 섞은 약물을 모두 마신 후, 같은 용기에 16oz 선까지 물이나 맑은 음료만을 부어서 마십니다 (두번 반복) 섞은 약물과 두번의 16oz 의 음료는 반드시 2 시간안에 모두 끝내야 합니다. (총 3 번의 16oz )
  - 11 PM :** 1 번과 같은 방법으로 나머지 약 한 병을 타서 마신 후 같은 양의 물이나 맑은 음료를 두 번 반복합니다.  
2 시간안에 모두 끝내십시오. (총 3 번의 16 oz)
- 시술 전날 자정이나 새벽 1 시 이후에는 물 포함, 모든 식음료를 금합니다.**